



بررسی انعطاف پذیری ریختی بی‌مه‌ره آبی *Caenins* (Ephemeroptera: Caenidae) در پاسخ به شرایط محیطی در مسیر رودخانه خیرودکنار

سعید شهبازی ناصرآباد، هادی پورباقر*، سهیل ایگدري، معین رجایی

گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

نوع مقاله:

پژوهشی

چکیده

انعطاف پذیری ریختی، قابلیت یک موجود به تغییر ریخت در پاسخ به شرایط محیطی می‌باشد. این مطالعه با هدف بررسی فرآیند انعطاف‌پذیری ریختی جمعیت بی‌مه‌ره آبی *Caenis latipennis* با استفاده از آنالیز outline به اجرا درآمد. پس از نمونه برداری از کفزیان در دو ایستگاه مطالعاتی در مسیر بالادست و پایین دست رودخانه خیرودکنار و سپس شناسایی تا حد گونه، از نمونه‌ها با استفاده از لوپ مجهز به دوربین دیجیتال عکسبرداری انجام شد. خط سیر پیرامونی بر روی تصاویر با لندمارک گذاری (نشانه گذاری اختصاصی) و استفاده از نرم افزار TpsDig2 تعیین گردید. سپس داده‌ها به نرم افزار R منتقل شدند و با پکیج Momocs مورد آنالیز قرار گرفتند. چهار ضریب فوریه استخراج شده، در آنالیز PCA مورد بررسی بیشتر قرار گرفت تا امتیازهای حاصله در دو ایستگاه در هر فصل از نمونه برداری مورد بررسی قرار گیرد. برای ارزیابی وجود اختلاف معنی‌دار بین هارمونیک outline های دو ایستگاه از آزمون MANOVA استفاده شد. نتایج حاصل از آنالیز ریخت سنجی هندسی، تفاوت شکل بدن بین این دو گروه را اثبات کرد به این معنی که شکل بدن نمونه‌های دو ایستگاه به طور معنی داری متفاوت بودند. مطالعه حاضر نشان داد که *C. latipennis* انعطاف پذیری ریختی نسبت به شرایط محیطی نشان داده و ممکن است بتواند به عنوان شاخص شرایط زیستگاه به کار رود.

تاریخچه مقاله:

دریافت: ۹۳/۰۳/۱۲

اصلاح: ۹۳/۰۴/۲۹

پذیرش: ۹۳/۰۵/۰۲

کلمات کلیدی:

بزرگ بی‌مه‌ره کفزی
انعطاف‌پذیری ریختی
شرایط محیطی
Caenis latipennis

مقدمه

فعالیت‌های انسانی (فاضلاب صنعتی، هرزآب‌های خانگی) باعث می‌شوند که مواد آلی در رسوبات تجمع پیدا کنند. مواد آلی در رسوبات دارای نقش مهمی بر روی جوامع بنتیک هستند. از جمله مهمترین اثر آنها تغییر در ساختار غذایی و زی‌توده جوامع بنتیک می‌باشد (Grebmeier et al., 1988). تأثیر آلاینده‌ها بر موجودات با توجه به نوع و حجم ورودی آنها متفاوت است. این اثرات در بالاترین سطوح موجب از بین رفتن فون و فلور منطقه شده و در مقادیر کم موجب حذف گونه‌های حساس از منطقه و حضور فراوان گونه‌های مقاوم می‌شود (Muniz et al., 2005; Galbrand et al., 2007).

آنالیز شکل (shape analysis)، دارای نقش کلیدی در بسیاری از مطالعات زیستی می‌باشد. انواعی از فرآیندهای زیستی (بیماری یا آسیب، نمو و توسعه آنتوژنیکی، سازگاری به فاکتورهای محیطی و جغرافیایی) سبب ایجاد گروه‌های متفاوت شکلی از افراد و یا گوناگونی‌های تکاملی طولانی مدت می‌شود. تفاوت در شکل، سبب نقش‌های عملکردی متفاوت و مشخص به

* نویسنده مسئول، پست الکترونیک: poorbagher@ut.ac.ir

وسیله بخش‌های مشابه و همچنین پاسخ‌های متفاوت به فشارها و نیروهای انتخابی یکسان می‌شود. آنالیز شکل یک نگرش برای فهم علل گوناگون تغییرات و تنوع و تغییرات مورفولوژیکی است (Dwivedi and Dubey, 2013). ریخت سنجی هندسی نقش بسیار مهمی را در انواع بسیاری از مطالعات زیست شناسی خصوصاً در زمینه سیستماتیک و اکولوژی ایفا می‌کند (Aytekin et al., 2007). این نوع ریخت سنجی به عنوان یک مطالعه آماری از اشکال زیستی و تغییرات شکل در میان جمعیت‌های مختلف تعریف شده است (Bookstein, 1997) و نسبت به روش‌های سنتی که بر ابعاد طولی موجود استوار است، قابلیت بیشتری برای نشان دادن تفاوت شکل‌های زیستی دارد (Rohlf and Marcus, 1993). شکل یک موجود زنده پایدار بوده و وراثت پذیری بالایی دارد. بنابراین، بررسی تشابهات شکلی موجود می‌تواند به عنوان روش دقیقی نسبت به اندازه، برای بررسی روابط نسبت شناسی و نیز روند تغییرات شکل در فرم‌های زیست شناسی مورد استفاده قرار گیرد (Rohlf and Marcus, 1993; Guill et al., 2003).

عوامل محیطی به عنوان نیرویی قدرتمند در شکل‌دهی ریخت موجودات در طی فرآیند فردزایی (تکامل فردی) شناخته شده است (Costa and Cataudell, 2007). شکل بدن نه تنها انعکاس دهنده ویژگی‌های ژنتیکی است بلکه می‌تواند منعکس کننده وضعیت محیط زندگی و زیستگاه موجودات نیز باشد (Guill et al., 2003). به عنوان مثال، ماهیانی که در آب جاری مثل رودخانه زیست می‌کنند دارای بدنی دوکی شکل و ماهیان آب‌های ساکن دارای بدنی پهن و فشرده از دو طرف هستند (Haas et al., 2011; Ostrand et al., 2001).

گونه *Caenidae latipennis* از خانواده *Caenidae* و از راسته *Ephemeroptera* (یک روزه‌ها) می‌باشد. این نوع حشرات دارای دگردیسی ناقص بوده و مراحل زندگی آنها شامل سه مرحله تخم، پوره‌ای و حشره کامل می‌باشد (Taylor and Kennedy, 2006). در این مطالعه مرحله پوره‌ای این خانواده که دارای فراوانی بالایی می‌باشند (Miyazaki and Lehmkuhl, 2011)، تحت بررسی ریخت‌شناسی قرار داده شد. این جنس در مناطق رسوبی و همچنین مناطق گل آلود آب‌های جاری و ساکن یافت می‌شوند (Thorp and Rogers, 2010; Clifford, 1991).

مقایسه ریختی به عنوان یک ابزار مفید برای تفکیک گروه‌ها و ساختارهای زیستی شبیه به هم می‌باشد، که در سالهای گذشته برای توسعه مطالعات تاکسونومی و انعطاف پذیری ریختی^۱ مورد استفاده قرار گرفته است. به دلیل آنکه تاکنون بررسی مشابهی بر روی بزرگ بی‌مهرگان کفزی (Macroinvertebrates) صورت نگرفته بود، مطالعه حاضر بر آن شد تا از این موجودات برای بررسی این روابط اکولوژیکی استفاده نماید. به دلیل تفاوت در میزان حساسیت گونه‌های مختلف بنتوز و همچنین وجود و عدم وجود آنها در شرایط زیستگاهی مختلف، گونه *C. latipennis* از خانواده *Caenidae* که به فراوانی در طول رودخانه خیرودکنار یافت می‌شد انتخاب گردید. علاوه بر این، تشخیص گونه‌های این خانواده نیز با دقت و ضریب اطمینان بالاتری همراه بود، لازمه این نوع ریخت شناسی هندسی تشخیص تا حد گونه و اطمینان از آن از یک سو و دارا بودن شکل آناتومیک مورد نیاز بررسی، از سوی دیگر می‌باشد. از این رو وجود تغییرات مورفولوژیک بی مهره آبی مورد نظر در نواحی آلوده و غیرآلوده رودخانه خیرودکنار که پیشینه تحقیقاتی کاملی از آن در اختیار داشتیم با استفاده از ریخت سنجی هندسی بر پایه خط سیر پیرامونی^۲ مورد بررسی قرار گرفت. این مطالعه می‌تواند گامی نخست برای درک بهتر انعطاف پذیری ریختی در ماکروبنتوزها باشد.


یکی از ویژگی‌های مهم چنین پروژه‌هایی استفاده از آنها برای تعیین شاخص‌های اکولوژیک و آلودگی بوده و به طور کلی از نتایج حاصل از تحقیقات هیدرولوژیک می‌توان در زمینه شناخت موجودات زنده یک اکوسیستم آبی و استفاده از آنها در تخمین شاخص‌های تنوع زیستی و همچنین قضاوت درباره وضعیت اکولوژیکی آب‌ها به ویژه از نقطه نظر زیست محیطی و به دست آوردن یک شناسنامه اکولوژیکی از منطقه مورد پژوهش استفاده نمود.

¹. Phenotype plasticity

². Outline

مواد و روش‌ها

نمونه برداری از رودخانه خیرودکنار در شهرستان نوشهر در استان مازندران انجام شد (شکل ۱). از آنجایی که این رودخانه در فصل تابستان دچار کم‌آبی شدید یا بی‌آبی می‌گردد، جزو رودخانه‌های فصلی به‌شمار می‌رود. این رودخانه از به‌هم‌پیوستن چند آبراهه از ارتفاعات شمالی رشته کوه البرز تشکیل شده و پس از عبور از منطقه جنگلی خیرودکنار وارد جلگه خیرود شده و پس از طی مسیری کوتاه به دریای خزر می‌پیوندد. این رودخانه یکی از شاخه‌های آبی فصلی بوده که دارای طول تقریبی ۱۰ کیلومتر است. بخش اعظم آن، حدود ۷ کیلومتر از مسیر رودخانه در منطقه جنگلی و بخش کوچکی از آن، حدود ۳ کیلومتر در ناحیه جلگه ای واقع شده و روستای نجرده در کنار آن قرار گرفته است (دژکام، ۱۳۸۹).



شکل ۱. موقعیت ایستگاه‌های مورد مطالعه در رودخانه خیرودکنار


به‌طور کلی در این پژوهش بر اساس موقعیت جغرافیایی و شرایط اکولوژیک حاکم بر اکوسیستم رودخانه، دو ایستگاه، که یکی از آنها در بالا دست رودخانه که هیچ منبع آلوده‌کننده‌ای پیرامون آن وجود نداشت و دیگری در کنار روستای نجرده بوده و آلودگی‌های زیادی به این ناحیه وارد می‌شد (نوربخش سامانی، ۱۳۹۰)، انتخاب گردید. ایستگاه ۲ در کنار مناطق مسکونی قرار داشت و بر خلاف ایستگاه ۱ بار آلودگی زیادی مانند فاضلاب‌های انسانی و حیوانی و کودهای کشاورزی به آن وارد می‌شد (شکل ۱). در طی چهارماه (اسفند ۱۳۹۱، فروردین، اردیبهشت و خرداد ۱۳۹۲) که رودخانه دارای آب بود به‌طور ماهانه از بی‌مه‌رگان کفزی رودخانه نمونه برداری گردید.

نمونه برداری از کفزیان با استفاده از دستگاه سوربر^۳ به ابعاد ۳۵×۳۵ سانتی‌متر و چشمه‌تور ۲۰۰ میکرون با برداشتن سنگ از بستر و تمیز کردن سطوح آن با برس نرم انجام گرفت. در این روش نمونه‌گیری، سطح سوربر در بستر رودخانه قرار گرفت و فردی که نمونه‌ها را جمع می‌کرد پشت سوربر در خلاف جهت جریان آب ایستاد و کلیه سنگ‌های موجود در بستر جریان آب را در سطح سوربر با استفاده از فرچه نرمی تمیز نمود. با این روش تمام موجودات بنتیک احتمالی به انتهای سوربر هدایت گردید. پس از آن تمام سطوح و انتهای تور در چارچوب سوربر شسته شدند و نمونه‌های جمع‌آوری شده به ظروف پلاستیکی

³. surber sampler

منتقل گردید. نمونه ها در ۲۰۰ میلی لیتر آب و ۱۳ میلی لیتر فرمالین ۴٪ قرار گرفته و جهت شناسایی به آزمایشگاه منتقل شدند. نمونه برداری در هر ایستگاه با سه تکرار صورت پذیرفت. در آزمایشگاه ابتدا کلیه محتویات ظروف در الک با چشمه ۵۰ میکرون خالی و پس از شستشوی کامل با آب، سنگریزه‌های درشت و برگ‌ها را جدا نموده و نمونه‌های بنتوز در پتری دیش جهت شناسایی زیر لوپ تخلیه گردید.

در میان گونه‌های جمع آوری شده، ابتدا ماکروبنتوز هدف جدا شده و سپس شناسایی بنتوز مورد نظر تا پایین ترین رده ممکن (ابتدا جنس و سپس گونه) انجام گرفت. برای شناسایی فون کفزیان از کلیدهای معتبر (Clifford, 1991; Gerber and Gabriel, 2002) استفاده شد و گونه *Caenis latipennis* برای انجام این مطالعه مورد استفاده قرار گرفت. سپس در آزمایشگاه از سطح پشتی نمونه‌ها با استفاده از لوپ مجهز به دوربین دیجیتال Cannon با قدرت تفکیک ۸ مگا پیکسل، عکس برداری شده و یک خط سیر پیرامونی توسط نرم افزار TpsDig2 بر روی قسمت‌های Pronotum (اولین صفحه خلفی ناحیه سینه‌ای) و Head (ناحیه سر موجود) قرار داده شد (شکل ۲). داده‌های مستخرج از نقاط نشانه گذاری شده ابتدا با استفاده از آنالیز پروکراست^۴ تصحیح گردید، تا اثر ویژگی‌های غیر شکل نظیر سایز، چرخش و جا به جایی نمونه‌ها حذف گردد (Klingenberg, 1998). سپس داده‌ها به نرم افزار R منتقل شدند و با پکیج Momocs مورد آنالیز قرار گرفتند. برای تعیین تعداد هارمونیک از قدرت تجمعی هارمونیک استفاده شد (شکل ۳). چهار ضریب فوریه استخراج شده، در آنالیز PCA مورد بررسی بیشتر قرار گرفت تا تفکیک امتیازهای حاصله در دو ایستگاه در هر فصل از نمونه برداری مشخص گردد. برای ارزیابی وجود اختلاف معنی دار بین هارمونیک outline های دو ایستگاه از آزمون تحلیل واریانس چند متغیره MANOVA استفاده شد. به منظور اطمینان از وجود تفاوت در شرایط محیطی و پارامترهای فیزیکیوشیمیایی دو ایستگاه مورد مطالعه، سرعت جریان آب با جسم شناور و همچنین نمونه برداری از آب رودخانه به منظور ثبت و تعیین پارامترهای فیزیکیوشیمیایی انجام گرفت. این سنجه های شیمیایی به وسیله دستگاه Palin Test در محل رودخانه اندازه گیری و ثبت شدند. فاکتورهایی همچون درجه حرارت آب، TDS (ppm)، EC (μS)، Turbidity (FTU)، NO_2^- ، NO_3^- ، PO_4^{3-} ، NH_3 ، NH_4^+ ، CaCO_3 ، HCO_3^- و CO_3^{2-} اندازه گیری شدند. جهت یافتن تفاوت آماری بین فاکتورهای فیزیکیوشیمیایی آب بین دو ایستگاه از t-test با نمونه های مستقل^۵ در نرم افزار SPSS15 استفاده شد.



شکل ۲. خط سیر پیرامونی رسم شده اطراف قسمت Pronotum و Head توسط نرم افزار TpsDig2

نتایج

آنالیز آماری پارامترهای فیزیکیوشیمیایی آب وجود تفاوت معنی دار در پارامترهای اسیدیته (pH)، کل جامدات محلول (TDS)، هدایت الکتریکی (EC)، کربنات کلسیم (CaCO_3)، بی کربنات ها (HCO_3^-) و کربنات ها (CO_3^{2-}) را در دو ایستگاه مورد مطالعه نشان داد (جدول ۱)، همچنین پارامترهای درجه حرارت، کدورت آب، نیتريت، نیترات و فسفات آب در دو ایستگاه تفاوت معنی

4. Generalised Procrustes Analysis

5. Independent sample t-test


داری را نشان ندادند (جدول ۱). بنابر نتایج بالا می‌توان چنین اذعان نمود که شرایط محیطی دو ایستگاه مورد مطالعه از نظر برخی پارامترها با هم متفاوت بوده است.

نتایج حاصل از آنالیز ریخت سنجی هندسی، تفاوت شکل بدن بین این دو گروه را اثبات کرد. به این معنی که شکل بدن در نمونه‌های دو ایستگاه به طور معنی داری متفاوت بودند ($P < 0.001$). همچنین آنالیز PCA توانست دو گروه مورد مطالعه را از نظر شکل بدن کاملاً از یکدیگر متمایز نماید. نتایج در چهار ماه مطالعه این تفاوت را نشان داد (شکل ۴). نتایج آزمون MANOVA بر روی ۹ هارمونیک اول مستخرج از outline ها نشان داد که اختلاف معنی داری بین شکل نمونه‌های دو ایستگاه در ماه‌های نمونه برداری شده وجود دارد (جدول ۲).


جدول ۱. مقادیر متوسط (میانگین \pm انحراف معیار) پارامترهای فیزیکی‌وشیمیایی آب ایستگاه‌های مورد مطالعه در ماه‌های مختلف

پارامترهای فیزیکی‌وشیمیایی	ایستگاه ۱	ایستگاه ۲	t	P
pH	$7/28 \pm 0/30$	$6/93 \pm 0/04$	3/974	0/002
Temperature ($^{\circ}\text{C}$)	$12/35 \pm 4/81$	$12/79 \pm 4/23$	-0/234	0/81
TDS (ppm)	$180/83 \pm 5/23$	$205/82 \pm 18/69$	-4/461	0/001
EC (μS)	$352/83 \pm 9/91$	$400/75 \pm 32/53$	-4/880	0/002
Turbidity (FTU)	$13/16 \pm 17/29$	$7 \pm 7/55$	1/132	0/26
NO ₂	$0/009 \pm 0/02$	$0/006 \pm 0/006$	0/432	0/67
NO ₃ ⁻	$1/01 \pm 0/45$	$1/63 \pm 1$	-1/942	0/065
PO ₄ ³⁻	$0/07 \pm 0/05$	$0/07 \pm 0/05$	-0/349	0/73
NH ₃	$0/09 \pm 0/11$	$0/26 \pm 0/29$	-1/905	0/07
NH ₄ ⁺	$0/1 \pm 0/11$	$0/28 \pm 0/30$	-1/929	0/06
CaCO ₃	$166/66 \pm 32/28$	$198/33 \pm 8/87$	-3/276	0/003
HCO ₃ ⁻	$203/75 \pm 39/49$	$241/66 \pm 11/14$	-3/201	0/004
CO ₃ ²⁻	$100 \pm 18/82$	$118/75 \pm 4/82$	-3/341	0/003

* درجه آزادی کلیه آزمون‌ها ۲۲ بود.



شکل ۳. قدرت تجمعی لندمارک که برای تعیین تعداد هارمونیک برای ماه اسفند استفاده گردید



شکل ۴. پراکنش امتیازهای حاصل از PCA برای نمونه‌های ایستگاه‌های ۱ و ۲ در اسفند (A)، فروردین (B)، اردیبهشت (C) و خرداد (D).

جدول ۲. آنالیز MANOVA بین دو ایستگاه برای تعیین اختلاف معنی دار در ۹ هارمونیک اول Outline نمونه ها

ماه		df	Hotelling-Lawley	approx_F	num_Df	den_Df	Pr (>F)
اسفند	اثر ایستگاه‌ها	1	276209	4932.3	56	1	0.01131
	باقیمانده			56			
فروردین	اثر ایستگاه‌ها	1	1535.2	76.762	60	3	0.002055
	باقیمانده			62			
اردیبهشت	اثر ایستگاه‌ها	1	3865.6	181.2	64	3	0.0005702
	باقیمانده			66			
خرداد	اثر ایستگاه‌ها	1	36684	611.39	60	1	0.03213
	باقیمانده			60			

بحث

نتایج بررسی حاضر نشان داد که شکل قسمت‌های ارزیابی شده بدن جمعیت‌های مطالعه شده تغییر یافته است و این امر، جدایی ریختی وابسته به زیستگاه را در جمعیت‌های بنتوز رودخانه خیرودکنار آشکار می‌سازد. در بسیاری از مطالعات نیز سازگاری به زیستگاه‌های متفاوت دلیل تفاوت شکل بدن بیان شده است (Robinson and Wilson, 1994; Hendry *et al.*, 2002; McGuigan *et al.*, 2003; Haas *et al.*, 2011; Nacua *et al.*, 2010; Langerhans *et al.*, 2010).

طبق پژوهش نوربخش در سال ۱۳۹۰ بر روی رودخانه خیرودکنار مشخص شد که خانواده Caenidae در مناطق بالادست روستای نجارده وجود ندارند و به سمت پایین رودخانه بر تعداد آنها افزوده می‌شود. همچنین این پژوهش با استفاده از آنالیز RAD^۶ مشخص نمود که خانواده Caenidae با خانواده شیرونومیده، فاکتورهای محیطی EC، TDS، دما و تعداد باکتری‌های آب و رسوبات رابطه مستقیم دارند، و با pH و نیترات رابطه معکوس دارند. در رودخانه کن نیز همین رابطه به اثبات رسیده بود (نوربخش سامانی، ۱۳۹۰). همانطور که بارها در منابع مختلف از جمله (Giller and Malmqvist, 1998) ذکر شده است شیرونومیده از گونه‌های مقاوم به آلودگی بوده و سازگاری‌های مختلف سبب تحمل زیستی آنها شده است، وجود رابطه مستقیم فراوانی آنها با خانواده Caenidae نیز می‌تواند تأیید کند که این خانواده نیز از گونه‌های مقاوم یکروزه‌ها (Ephemeroptera) می‌باشد. هرچند بعضی از منابع نیز این موضوع را مستقلاً خود گزارش داده‌اند (Giller and Malmqvist, 1998; Taylor and Kennedy, 2006).

با توجه به تفاوت‌های ویژگی محیطی رودخانه می‌توان دلیل اصلی تفاوت‌های ریختی را به دلیل سازگاری‌های بزرگ بی‌مهرگان کفزی با شرایط زیستگاهی متفاوت دانست. مطالعه نوربخش سامانی در سال ۱۳۹۰ نشان می‌دهد که بعضی از خانواده‌های راسته Ephemeroptera مانند Caenidae که شاخص آب‌های راکد و تمیز می‌باشند، هم در شرایط آلوده و هم در شرایط غیرآلوده وجود داشته‌اند و دلیل خود را برای این موضوع سازگار شدن با شرایط آلودگی و بالا رفتن قدرت تحمل‌شان بیان می‌کند.

ایستگاه اول این پژوهش در بالا دست رودخانه و در پایین منطقه جنگلی در نظر گرفته شد، تعداد باکتری‌های کمتری در این منطقه گزارش شده‌اند و نیز بار آلودگی آن بسیار پایین بود (نوربخش سامانی، ۱۳۹۰). ایستگاه دوم این مطالعه جنب روستای نجارده قرار داشت و فاضلاب‌های خانگی، کشاورزی و حیوانی به این ایستگاه وارد می‌شد، همچنین مطالعه (نوربخش سامانی،

⁶. redundancy

محققان تاکید می‌کنند که علاوه بر اهمیت مطالعات تنوع مورفولوژیکی به عنوان یک رویکرد برای تمایز ذخایر فنوتیپی، تنوع فنوتیپی جمعیت نشان دهنده تاریخچه تکاملی خود می‌باشد. فشارهای مختلف انتخابی می‌تواند موجب حفظ فنوتیپ‌های مختلف شود و آنالیزهای مورفولوژیکی نیز برای نشان دادن این تفاوت‌های تطبیقی مفید هستند (Cadrin, 2000). گونه‌های مختلف حشرات آبی اغلب دارای سازگاری مورفولوژیکی و رفتاری هستند که منحصر به زیستگاه زندگی شان بوده و بنابراین منعکس کننده شکل پذیری فنوتیپی قابل توجهی از حشرات می‌باشد (Ward, 1992).

Bhattacharya و همکاران (۲۰۰۶) نشان دادند که تنوع گونه‌ای و فراوانی شیرونومیده‌ها در مناطق آلوده صنعتی نسبت به مناطق مرجع که آلودگی ندارند بسیار کمتر می‌باشد. آنها همچنین نشان دادند که میزان بدشکلی در شیرونومیده‌ها و لاروهای حاصل از آنها در مناطق آلوده بسیار بیشتر از مناطق غیر آلوده می‌باشد و این بدشکلی با افزایش غلظت فلزات سنگین همبستگی مثبت داشت.

مطالعه ریخت‌سنجی هندسی با کاربرد روش خط سیر پیرامونی در گونه‌های مربوط به جنس *Erodiontes* از خانواده Tenebrionidae که از سوسکه‌ها (دوبالان) می‌باشند نشان داد که فاکتورهای محیطی نظیر دما و تغذیه باعث ایجاد تفاوت مشخص در اندازه pronotum دو گونه *E.pfaundleri* و *E.aelleni* شده است (Taravati et al., 2009). این مطالعه نیز نتایج تحقیق حاضر را تایید می‌کند.

مطالعه تنوع فنوتیپی با استفاده از روش مطالعه حاضر (خط سیر پیرامونی) در بین جمعیت‌های مگس شنی فلبوتوموس از خانواده Psychodidae و راسته Diptera در سه رشته کوه مهم جنوب ترکیه نشان داد که هیچ تفاوت آماری مهمی در مورفولوژی بال در همه گونه‌های مورد بررسی و در هر دو جنس افراد محلی یافت نشده است، این نتایج نشان می‌دهد که موانع برای متوقف کردن رانش ژنی میان پشه محلی کافی نبوده است (Aytekin, 2007).

تفاوت‌های مشاهده شده در دو ایستگاه مورد مطالعه علاوه بر آلودگی و شدت جریان آب، ممکن است که تحت تاثیر دسترسی به مواد غذایی نیز باشد (Johnson, 1987)، به طور کلی این گروه از ماکروبن‌توزها در گروه تغذیه‌ای gathering collectors قرار می‌گیرند (Taylor and Kennedy, 2006). با توجه به اینکه تفاوت‌های شکلی تحت تاثیر عوامل مختلفی می‌باشد لذا به نظر می‌رسد مطالعه در مورد سایر جنبه‌های زیست‌شناسی این موجودات از جمله روابط شکار و شکارگری، استرس‌های محیطی، آلاینده‌ها و غیره می‌تواند در درک بهتر علل و عوامل موثر بر تفاوت‌های شکلی مفید باشد. در مجموع می‌توان گفت نتیجه این پژوهش می‌تواند سرآغازی برای مطالعات بیشتر در محدوده‌های زمانی و مکانی گسترده‌تر، چرایی و چگونگی این تغییرات و همچنین مطالعات جامع و دقیقی در مورد سازگاری‌های مختلف این حشرات آبی در یک بخش بزرگ باشد.

منابع

دژکام، س. ۱۳۸۹. شناسایی بی‌مهرگان آبی رودخانه خیرودکنار. پایان‌نامه کارشناسی. دانشگاه تهران. دانشکده منابع طبیعی. گروه شیلات. ۴۳ص.

نوربخش سامانی، ن. ۱۳۹۰. بررسی رابطه بین شاخص‌های زیستی بی‌مهرگان آبی ماکروبن‌تیک و شاخص‌های بهداشتی باکتریولوژیک رودخانه‌ها. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران. دانشکده منابع طبیعی. گروه شیلات. ۷۰ص.

- Aytekin, A.M., Alten, B., Caglar, S.S., Ozbel, Y., Kaynas, S., Simsek, F.M., Belen, A. 2007. Phenotypic variation among local populations of phlebotomine sand flies (Diptera: Psychodidae) in southern Turkey. *Journal of Vector Ecology*. 32(2): 226-234.
- Barbour, M.T., Gerritsen, J., Snyder, B.D., Stribling, J.B. 1999. Rapid bioassessment protocols for use in streams and wadeable rivers. USEPA, Washington. 408 p.
- Bhattacharya, G., Sadhu, A.K., Mazumdar, A., Majumdar, U., and Chaudhuri, P.K. 2006. Assessment of impact of heavy metals on the communities and morphological deformities of chironomidae larvae in the river Damodar (India, West Bengal). *Acta Hydrobiologica (Cracow)*. 8: 21-32.
- Booke, H.E. 1981. The conundrum of the stock concept-Are nature and nurture definable in fishery science?. *Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Science*. 38: 1479-1480.
- Bookstein, F.L. 1997. *Morphometric tools for landmark data: geometry and biology*. Cambridge University Press. 435 p.

- Cadrin, S.X. 2000. Advances in morphometric identification of fishery stocks. *Reviews in Fish Biology and Fisheries*. 10(1): 91-112.
- Clifford, H.F. 1991. *Aquatic invertebrates of Alberta: An illustrated guide*. University of Alberta. 538 p.
- Costa, C., Cataudella, S. 2007. Relationship between shape and trophic ecology of selected species of Sparids of the Caprolace coastal lagoon (Central Tyrrhenian sea). *Environmental Biology of Fish*. 78: 115-123.
- Dadikyan, M.G. 1973. Variability of the Armenian riffle minnow (*Alburnoides bipunctatus eichwaldi* (Filippi)) in relation to the altitude at which it occurs. *Journal of Ichthyology*. 13: 68-78.
- Demandt, M.H., Bergek, S. 2009. Identification of cyprinid hybrids by using geometric morphometrics and microsatellites. *Journal of Applied Ichthyology*. 25(6): 695-701.
- Dwivedi, A.K., Dubey, V.K. 2013. Advancements in morphometric differentiation: a review on stock identification among fish populations. *Reviews in Fish Biology and Fisheries*. 23(1): 23-39.
- Farre, M., Tuest, V.M., Maynou, F., Recasens, L., Lombarte, A. 2013. Geometric morphology as an alternative for measuring the diversity of fish assemblages. *Ecological Indicators*. 159-166.
- Galbrand, C., Lemieux, I.G., Ghaly, A.E., Côté, R., Verma, M. 2007. Assessment of constructed wetland biological integrity using aquatic macroinvertebrates. *Online Journal of Biological Sciences*. 7(2): 52-65.
- Gerber, A., Gabriel, M.J.M. 2002. *Aquatic Invertebrates of South African Rivers Field Guide*. 149 p.
- Giller, P.S., Malmqvist, B. 1998. *The biology of streams and rivers*. Oxford University Press. 296 p.
- Grebmeier, J.M., McRoy, C.P., Feder, H.M. 1988. Pelagic-benthic coupling on the shelf of the northern Bering and Chukchi seas. 1. Food supply source and benthic biomass. *Marine ecology progress series*. Oldendorf, 48(1): 57-67.
- Guill, J.M., Hood, C.S., Heins, D.C. 2003. Body shape variation within and among three species of darters (Perciformes: Percidae). *Ecology of Freshwater Fish*. 12: 134-140.
- Haas, T.C., Blum M.J., Heins, D.C. 2011. Morphological responses of a stream fish to water impoundment. *Biology Letter*. 6: 803-806.
- Harrison, S.S., Dobson, M., Lancaster, J., Briers, R.A. 2008. Evolutionary drivers and the ecological traits of adult aquatic insects. In *Aquatic Insects: Challenges to Populations: Proceedings of the Royal Entomological Society's 24th Symposium*. 250 pp.
- Helland, I.P., Vøllestad, L.A., Freyhof, J., Mehner, T. 2009. Morphological differences between two ecologically similar sympatric fishes. *Journal of Fish Biology*. 75(10): 2756-2767.
- Hendry, A.P., Taylor, E.B., McPhail, J. D. 2002 Adaptive divergence and the balance between selection and gene flow: lake and stream stickleback in the misty system. *Evolution*. 56: 1199-1216.
- Hurn, A.D., Wallace, J.B., Anderson, N.H. 2008. *Habitat, life history, secondary production, and behavioral adaptations of aquatic insects. An introduction to the aquatic insects of North America*. 4th edition. Kendall/Hunt Publishing Company, Dubuque, Iowa, 55-103.
- Johnson, R.K. 1987. Seasonal variation in diet of *chironomus plumosus* (L) and *C. anthracinus* (Zett) (Diptera: Chironomidae) in mesotrophic Lake Erken. *Freshwater Biological*. 17: 525-535.
- Klingenberg, C.P. 1998. Heterochrony and allometry: the analysis of evolutionary change in ontogeny. *Biological Reviews of the Cambridge Philosophical Society*. 73(01): 79-123.
- Langerhans, R.B., Reznick, D.N. 2010. Ecology and evolution of swimming performance in fishes: predicting evolution with biomechanics. In: *Fish locomotion: an ecoethological perspective* (eds. Domenici, P. and Kapoor, B.G.). Science Publishers Inc, Enfield. 200-248 p.
- Lopez-Romero, F., Zuniga, G., Martínez-Jeronimo, F. 2012. Asymmetric patterns in the cranial skeleton of zebrafish (*Danio rerio*) exposed to sodium pentachlorophenate at different embryonic developmental stages. *Ecotoxicology and environmental safety*. 84: 25-31.
- Márquez, F., Robledo, J., Peñaloza, G.E., Van der Molen, S. 2010. Use of different geometric morphometrics tools for the discrimination of phenotypic stocks of the striped clam *Ameghinomya antiqua* (Veneridae) in north Patagonia, Argentina. *Fisheries Research*. 101(1): 127-131.
- McGuigan, K., Franklin, C.E., Moritz, C., Blows, M.W. 2003. Adaptation of rainbow fish to lake and stream habitats. *Evolution*. 57: 104-118.
- Miyazaki, R., Lehmkühl, D.M. 2011. *Insects of the Saskatchewan River System in Saskatchewan*. 119-157 pp.

- Muniz, P., Venturini, N., Pires-Vanin, A., Tommasi, L. R., Borja, A. 2005. Testing the applicability of Marine Biotic Index (AMBI) to assessing the ecological quality of soft-bottom benthic communities, in the America Atlantic region. *Marine Pollution Bulletin*. 50: 624-637.
- Nacua, S.S., Dorado, E.L., Torres, M.A.J., Demayo, C.G. 2010. Body shape variation between two populations of the white goby, *Glossogobius giuris*. *Research Journal of Fisheries and Hydrobiology*. 5: 44-51.
- Ostrand, K.G., Wilde, G.R., Strauss, R.E., Young, R.R. 2001. Sexual dimorphism in *plains minnow*, *Hybognathus placitus*. *Copeia*. 2001(2): 563-565.
- Pati, P., Patra, P.K. 2012. Benthic foraminiferal responses to coastal pollution: a review. *International Journal of Geology, Earth and Environmental Sciences*. 2: 42-56.
- Robinson, B.W., Wilson, D.S. 1994. Character release and displacement in fishes: a neglected literature. *American Nature*. 144: 596-627.
- Rohlf, F.J., Marcus L.F. 1993. A revolution in morphometrics. *Trends in Ecology and Evolution*. 8: 129-132.
- Statzner, B. 2008. How views about flow adaptations of benthic stream invertebrates changed over the last century. *International Review of Hydrobiology*. 93(4-5): 593-605.
- Taravati, S., Darvish, J., Mirshamsi, O. 2009. Geometric morphometric study of two species of the psammophilous genus *Erodiontes* (Coleoptera: Tenebrionidae) from the Lute desert, Central Iran. *Iranian Journal of Animal Biosystematics*. 5: 81-89.
- Taylor, J.M., Kennedy, J.H. 2006. Life history and secondary production of *Caenis latipennis* (Ephemeroptera: Caenidae) in Honey Creek, Oklahoma. *Annals of the Entomological Society of America*. 99(5): 821-830.
- Thorp, J.H., Rogers, D.C. (Eds.). 2010. *Field Guide to Freshwater Invertebrates of North America: Access Online via Elsevier*. 274 p.
- Ward, J.V. 1992. *Aquatic insect ecology*. 1. Ecology and habitat. John Wiley & Sons, Inc. 438 p.
- Wootton, R.J. 1991. *Ecology of teleost fishes*. Chapman and Hall Ltd., London. 386 p.
- Zelditch, M.L., Swiderski, D.L., Sheets, H.D. 2012. *Geometric morphometrics for biologists: a primer*. Academic Press. 488 p.