



بررسی وضعیت زیستگاه‌های طبیعی صدف مرواریدساز *Pinctada radiata* در اطراف جزیره لاوان، شمال خلیج فارس

محمد موحدی نیا^{۱*}، حسین رامشی^۱، احسان کامرانی^۲، ایمان سوری نژاد^۳، شهرام صیدمرادی^۱، عبدالله اسماعیل زاده^۱

^۱ ایستگاه تحقیقات شیلاتی نرمتنان خلیج فارس، بندرلنگه، صندوق پستی: ۱۳۶۳۷-۷۹۷۶۱

^۲ گروه زیست‌شناسی دریا، دانشکده علوم پایه، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس

^۳ گروه شیلات، دانشکده علوم و فنون دریایی و جوی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس

نوع مقاله:	چکیده
پژوهشی	صدف مرواریدساز <i>Pinctada radiata</i> گونه غالب صدف مرواریدساز اقتصادی در خلیج فارس به خصوص سواحل ایرانی به شمار می‌رود. در این مطالعه، وضعیت زیستگاه‌های طبیعی این صدف و ذخایر آن در صیدگاه‌های سابق بررسی شد. آب‌های کم عمق اطراف جزیره لاوان به وسیله عملیات غواصی جستجو گردید و در نهایت دو زیستگاه لاوان ۱ (دردور) و لاوان ۲ (هدآباد) در آب‌های اطراف این جزیره یافت شد. زیستگاه‌های مذکور به ترتیب ۶۰ و ۱۵ هکتار مساحت داشتند و صدف‌های مرواریدساز محار به ترتیب در دامنه عمقی ۷ تا ۱۲ و ۵ تا ۱۱ متر دارای بیشترین پراکنش بودند. کل ذخایر موجود در زیستگاه دردور و هدآباد حدود ۳۵۷۰۰۰ و ۶۱۵۰۰۰ قطعه صدف برآورد گردید که به ترتیب ۱۱٪ و ۱۷٪ صدف‌ها قابلیت صید داشتند. میزان شاخص صید بر واحد سطح در زیستگاه‌های دردور و هدآباد به ترتیب $0/6 \text{ N/m}^2$ و $0/4 \text{ N/m}^2$ محاسبه گردید. میزان شاخص صید بر واحد تلاش نیز برای زیستگاه‌های مذکور به ترتیب 119 N/hr و 82 N/hr محاسبه شد. میزان زی‌توده در این زیستگاه‌ها به ترتیب ۴۶۲۰ و ۱۱۶۳ کیلوگرم به دست آمد. نتایج تحقیق نشان داد که مساحت زیستگاه‌های بررسی شده، ذخایر صدف‌های موجود در آنها و میزان شاخص صید بر واحد سطح، نسبت به سالیان اخیر کاهش یافته و به رغم ممنوعیت فعالیت‌های صیادی در منطقه طی ۷ سال اخیر، بازسازی ذخایر به کندی صورت گرفته است.
تاریخچه مقاله:	
دریافت: ۹۲/۰۸/۲۰	
اصلاح: ۹۲/۱۲/۱۵	
پذیرش: ۹۲/۱۲/۲۰	
کلمات کلیدی:	
صدف مرواریدساز	
زیستگاه طبیعی	
زی‌توده	
جزیره لاوان	

مقدمه

سواحل و آب‌های کم عمق مناطق غربی استان هرمزگان، همواره از زیستگاه‌های طبیعی مهم صدف‌های مرواریدساز به شمار می‌رفته است که امروزه ذخایر صدف‌های آنها از بین رفته است. حوضه‌های واقع در استان هرمزگان، عمده‌ترین ذخایر طبیعی صدف‌های مرواریدساز در سواحل شمالی خلیج فارس را در گذشته به خود اختصاص می‌داد و شناورهای فراوانی در زمینه صید صدف‌ها و استحصال مروارید به فعالیت می‌پرداختند (Carter, 2005). صدف مرواریدساز محار *Pinctada radiata* (Leach, 1814)، گونه غالب صدف مرواریدساز اقتصادی در خلیج فارس به خصوص در سواحل ایرانی به شمار می‌رود (Carter, 2005)، به گونه‌ای که به لحاظ صید مروارید و نیز دارا بودن ارزش غذایی، از گذشته مورد توجه ساکنان بومی منطقه

* نویسنده مسئول، پست الکترونیک: momnia64@gmail.com

و صیادان محلی بوده و در گذشته نقش زیادی در تامین درآمد خانوار و بهبود وضعیت اقتصادی جامعه داشته است (نوربخش، ۱۳۷۰). این گونه با ارزش در بازارهای جهانی با نام صدف مرواریدساز لنگه ای نیز شناخته می‌شود (جهانگرد و همکاران، ۱۳۷۶) و در سال‌های نه چندان دور، مرواریدهای حاصل از آن در منطقه خلیج فارس، تامین کننده ۸۰ درصد مروارید طبیعی عرضه شده در بازارهای جهانی بوده است (فاطمی، ۱۳۶۹). عمده ترین مناطق پراکنش این صدف در خلیج فارس، در طول سواحل غرب استان هرمزگان و استان بوشهر و نیز در اطراف جزایر کیش، هندورابی، فارور، هرمز، لارک، تنب بزرگ و کوچک و ابوموسی می‌باشد (حسین زاده صحافی و همکاران، ۱۳۷۹). صنعت استحصال مروارید در سواحل غربی هرمزگان طی دهه های اخیر بیشتر در سواحل بنادر مقام، نخیلو، میچاییل و چیرویه و نیز اطراف جزیره لاوان رواج داشته است (حسین زاده صحافی، ۱۳۷۲).

متاسفانه ذخایر طبیعی این گونه با ارزش که سابقه صید آن در منطقه به بیش از ۲۰۰۰ سال قبل از میلاد بر می‌گردد (رائی، ۱۹۸۰؛ نوربخش، ۱۳۷۰)، طی سال‌های اخیر به شدت رو به کاهش نهاده، به گونه ای که بر اساس مطالعات صورت گرفته، در مناطقی که در گذشته به عنوان زیستگاه طبیعی و محل صید این صدف بوده است، هیچ گونه صدفی مشاهده نشده و یا اینکه تراکم آنها به شدت کاهش یافته است (رامشی، ۱۳۸۰؛ رامشی و همکاران، ۱۳۸۶).

وضعیت ذخایر صدف‌های مرواریدساز محار در آب‌های اطراف جزیره لاوان و بندر نخیلو توسط جهانگرد و همکاران (۱۳۷۶) بررسی گردید. کل ذخیره موجود در زیستگاه نخیلو ۱۵۱ میلیون قطعه و کل ذخیره موجود در زیستگاه لاوان ۸/۵ میلیون قطعه صدف برآورد گردید. میزان صدف‌های قابل صید برای دو منطقه نخیلو و لاوان به ترتیب ۱۵ و ۲۰ درصد محاسبه شد. تراکم صدف‌ها نیز در هر دو منطقه در دامنه عمقی ۵ تا ۱۰ متر به طور قابل ملاحظه ای بیشتر ارزیابی گردید (جهانگرد و همکاران، ۱۳۷۶). در مطالعه دیگری که بر روی ذخایر صدف‌های مرواریدساز محار در مناطق غربی استان هرمزگان توسط رامشی و همکاران (۱۳۸۶) انجام شد، زیستگاه‌هایی در اطراف جزایر لاوان و هندورابی و نیز در سواحل بندر نخیلو مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق پراکنش صدف‌ها در اکثر زیستگاه‌ها در اعماق هفت تا ۱۱ متر مشاهده شد که در اعماق بالاتر، تراکم آنها به میزان زیاد کاهش پیدا کرده و یا اینکه هیچ گونه صدفی مشاهده نگردید. میزان صدف‌های با اندازه تجاری که قابلیت صید داشتند نیز در زیستگاه‌های در دور لاوان ۵۸/۵، هدآباد لاوان ۶۶/۹، نخیلو ۵۲/۸ و هندورابی ۵۷/۶ درصد به دست آمد. (رامشی و همکاران، ۱۳۸۶).

با توجه به ممنوعیت صید صدف از سال ۸۵، هیچ مطالعه ای در زمینه بررسی ذخایر صدف‌های مرواریدساز در آب‌های جنوبی کشور طی این مدت صورت نگرفته است. ممنوعیت صید فرصت مناسبی برای بازسازی ذخایر صدف‌ها فراهم خواهد آورد و انجام کارهای تحقیقاتی جدید در این زمینه، اطلاعات ارزشمندی را در اختیار خواهد گذاشت. بدون شک با احیای مجدد ذخایر این گونه با ارزش و حفظ آن، صید صدف و استحصال مروارید طبیعی و پرورشی رونق خواهد یافت و چرخ اقتصاد این خطه از میهن پهناورمان بیش از پیش خواهد چرخید. از این رو تحقیق حاضر، به مطالعه وضعیت کنونی زیستگاه‌های طبیعی صدف‌های مرواریدساز محار در آب‌های اطراف جزیره لاوان از نظر مساحت و دامنه عمقی پراکندگی صدف‌ها می‌پردازد. ذخایر موجود در این زیستگاه‌ها از نظر شاخص‌هایی نظیر میزان کل ذخیره، زی‌توده، صید بر واحد تلاش^۱ CPUE، صید بر واحد سطح^۲ CPUA و نیز میزان صدف‌های قابل صید بررسی و ارزیابی می‌گردد.


مواد و روش‌ها

این مطالعه در آب‌های اطراف جزیره لاوان واقع در ناحیه غربی استان هرمزگان صورت پذیرفت (شکل ۱. الف). این مناطق از زمان‌های قدیم جزو صیدگاه‌های اصلی صدف‌های مرواریدساز کشور بوده و از مهم‌ترین ذخیره گاه‌های طبیعی آنها محسوب می‌شده است (حسین زاده صحافی، ۱۳۷۲؛ جهانگرد و همکاران، ۱۳۷۶؛ رامشی، ۱۳۸۰؛ رامشی و همکاران، ۱۳۸۶). به منظور یافتن زیستگاه‌ها و بررسی ذخایر صدف‌های مرواریدساز محار، گشت‌های دریایی در آب‌های کم عمق اطراف جزیره لاوان

¹ Catch Per Unit of Effort


² Catch Per Unit of Area

طی اردیبهشت ماه و خرداد ماه ۱۳۹۰ با بهره گیری از عملیات غواصی به روش های Manta Tow، Snorkeling و SCUBA تا عمق حدود ۱۵ متری منطقه با استفاده از یک فروند قایق موتوری صورت گرفت که در نهایت دو زیستگاه در اطراف جزیره لاوان شامل دردور (Dardoor) با مختصات جغرافیایی ۲۶° ۵۰' شمالی و ۵۳° ۰۹' شرقی و زیستگاه هدآباد (Hedabad) با مختصات جغرافیایی ۲۶° ۴۹' شمالی و ۵۳° ۱۱' شرقی انتخاب گردید (شکل ۱. ب). به منظور تعیین محدوده پراکنش صدف‌ها و محاسبه مساحت زیستگاه‌ها، نقاط اطراف مناطق دارای صدف به وسیله GPS دستی مدل Garmin 12 channel ثبت شده و در پاره ای موارد برخی نقاط با استفاده از بویه علامت گذاری گردید. در نهایت، مساحت زیستگاه های مورد بررسی با استفاده از موقعیت های ثبت شده، به روش پلانی متر تعیین شد.



شکل ۱. موقعیت جزیره لاوان در ناحیه غربی استان هرمزگان (الف) و موقعیت زیستگاه های بررسی شده در اطراف این جزیره (ب)

به منظور نمونه برداری از ذخایر در زیستگاه ها، به صورت فصلی و طی ۴ فصل از پاییز ۱۳۹۰ تا تابستان ۱۳۹۱، از عملیات غواصی و روش ترانسکت کمربندی Belt Transect و کوادرات های تصادفی ۰/۵×۰/۵ متر مربع که در زیر آب به وسیله غواص پرتاب گردید، استفاده شد (Hill and Wilkinson, 2004). در هر زیستگاه سه ترانسکت عمود بر ساحل در نظر گرفته شد که طول و عرض ترانسکت ها جهت نمونه برداری، بسته به فراوانی صدف‌های مشاهده شده، به ترتیب بین ۱۰ تا ۱۳۰ متر و دو تا هشت متر متغیر بود (Sims, 1992). در اکثر موارد که تراکم صدف‌های محار در حد پایینی قرار داشت، از کوادرات استفاده نگردید و صرفاً به جمع آوری دستی نمونه ها از اطراف ترانسکت ها توسط غواص اکتفا شد و حتی در برخی مناطق، نقاطی فراتر از محدوده ترانسکت ها به منظور یافتن صدف توسط غواص جستجو گردید. نمونه های جمع آوری شده، به سطح آب و درون قایق انتقال داده شد و پس از جداسازی موجودات مزاحم از آنها و شستشوی صدف ها، شمارش آنها صورت گرفت. به منظور زیست سنجی صدف ها، ارتفاع پوسته صدف یا اندازه پشتی - شکمی^۴ DVM^۴ (شکل ۲) به وسیله کولیس ورنیه با دقت ۰/۱ میلی متر اندازه گیری گردید (Sims, 1988). وزن کل صدف نیز با استفاده از ترازوی دیجیتال مدل Mettler pm1200 با دقت ۰/۰۱ گرم تعیین شد (Mohammed and Yassien, 2003).



شکل ۲. اندازه پشتی - شکمی صدف محار جهت زیست سنجی (اقتباس از Gervis and Sims, 1992)

³ Self-Contained Underwater Breathing Apparatus


⁴ Dorso-Ventral Measurement

با شمارش مجموع تعداد صدف‌های نمونه برداری شده در هر زیستگاه و در نظر گرفتن مجموع مساحت منطقه نمونه برداری (مساحت کواردرات یا مساحت جستجو شده توسط غواص)، تعداد کل صدف‌های موجود در هر زیستگاه از طریق تعمیم صدف‌های نمونه برداری شده به کل مساحت زیستگاه محاسبه شد. زی توده در هر زیستگاه نیز به صورت میزان معادل وزنی کل ذخیره محاسبه گردید. صید بر واحد سطح (CPUA) نیز به صورت تعیین تعداد صدف‌های موجود در واحد سطح (متر مربع) با استفاده از محاسبه میزان صدف‌های نمونه برداری شده در مساحت کل نمونه برداری تعیین شد (Sims, 1992). صید بر واحد تلاش (CPUE) نیز بر حسب تعداد صدف‌های صید شده در هر ساعت از نمونه برداری تعیین گردید. درصد فراوانی صدف‌های قابل صید با DVM بزرگ‌تر از ۶۰ میلی‌متر از طریق رابطه زیر تعیین گردید.

$$N_{DVM} = N_C \times 60\% / N_q \times 100 \quad (\text{Sims, 1992})$$

نتایج

صدف‌های مروارید ساز محار در زیستگاه در دور که حدود ۶۰ هکتار مساحت داشت، عمدتاً در دامنه عمقی بین ۷ تا ۱۲ متر، دارای بیشترین پراکنش بودند. از این زیستگاه ۴۷۶ نمونه طی ۴ فصل جمع‌آوری شد که میانگین اندازه پستی-شکمی صدف‌ها $40/20 \pm 14/98$ میلی‌متر و میانگین وزن کل صدف‌ها $12/87 \pm 12/94$ گرم تعیین گردید. صدف‌های مروارید ساز محار در زیستگاه هدآباد که حدود ۱۵ هکتار مساحت داشت، عمدتاً در دامنه عمقی بین ۵ تا ۱۱ متر، دارای بیشترین پراکنش بودند. از این زیستگاه ۳۲۸ نمونه طی ۴ فصل جمع‌آوری شد که میانگین اندازه پستی-شکمی صدف‌ها $41/30 \pm 17/17$ میلی‌متر و میانگین وزن کل صدف‌ها $15/64 \pm 16/70$ گرم تعیین گردید. بررسی نمودار توزیع فراوانی سالانه کلاس‌های طولی در این دو زیستگاه (شکل ۳) نشان می‌دهد که کلاس طولی ۴۵ تا ۴۸ میلی‌متر دارای بیشترین فراوانی در هر دو زیستگاه می‌باشد.



شکل ۳. نمودارهای توزیع فراوانی سالانه کلاس‌های طولی صدف محار در زیستگاه در دور (الف: N=۴۷۶) و زیستگاه هدآباد (ب: N=۳۲۸)

کل ذخایر موجود در زیستگاه در دور حدود 357000 قطعه صدف محار برآورد گردید که از کل ذخایر این زیستگاه، ۱۱ درصد صدف‌ها قابلیت صید داشتند. تعداد صدف‌های موجود در واحد سطح این زیستگاه که صید بر واحد سطح CPUA نامیده شد، برابر با $0/6$ قطعه صدف بر مترمربع برآورد گردید. شاخص صید بر واحد تلاش CPUE نیز برابر با ۱۱۹ قطعه صدف در هر ساعت غواصی محاسبه شد. کل وزن زی توده موجود در این زیستگاه نیز برابر با 4620 کیلوگرم برآورد گردید. کل ذخایر موجود در زیستگاه هدآباد حدود 61500 قطعه صدف محار برآورد گردید که از کل ذخایر این زیستگاه، ۱۷ درصد صدف‌ها قابلیت صید داشتند. تعداد صدف‌های موجود در واحد سطح این زیستگاه که صید بر واحد سطح CPUA نامیده شد، برابر با $0/4$ قطعه صدف بر مترمربع برآورد گردید. شاخص صید بر واحد تلاش CPUE نیز برابر با ۸۲ قطعه صدف در هر ساعت غواصی محاسبه شد. کل وزن زی توده موجود در این زیستگاه نیز برابر با 1163 کیلوگرم برآورد گردید.

بحث

مساحت زیستگاه های بررسی شده در این تحقیق برای زیستگاه های در دور و هدآباد به ترتیب برابر با ۶۰ و ۱۵ هکتار محاسبه گردید که نسبت به مساحت زیستگاه های مطالعه شده در سالیان اخیر پایین تر است (جدول ۱). مساحت زیستگاه های صدف محار در سال های گذشته حتی تا حدود چند صد هکتار نیز می رسیده (جهانگرد و همکاران، ۱۳۷۶) ولی در دهه اخیر به شدت کاهش پیدا کرده است (جدول ۱). تراکم صدف های مرواریدساز محار (صید بر واحد سطح) در زیستگاه های بررسی شده حتی به میزان یک قطعه صدف در هر متر مربع نیز نمی رسد و این میزان نسبت به تراکم صدف ها در سالیان اخیر در این مناطق، رقم بسیار پایین تری است (جدول ۱). میزان کل ذخایر محاسبه شده در زیستگاه ها نیز همان گونه که در جدول ۱ مشخص است، در مقایسه با سالیان گذشته بسیار کم تر می باشد. تراکم بسیار پایین صدف های مرواریدساز محار در اکثر مناطق مورد بررسی، باعث شد تا در انتخاب مکان های نمونه برداری مشکلاتی ایجاد گردد. در حالی که تراکم صدف ها در برخی نقاط بسیار خوب ارزیابی شد، به یک باره در فواصل اندکی از نقاط مذکور، تراکم صدف ها به شدت پایین می آمد و یا اینکه در پهنه وسیعی از یک زیستگاه هیچ گونه صدفی مشاهده نمی شد. به نظر می رسد الگوی پراکنش صدف ها در زیستگاه های مذکور به صورت لکه ای^۵ باشد. میانگین سالانه اندازه پستی - شکمی صدف ها در زیستگاه های بررسی شده در تحقیق حاضر در حدود ۴۰ میلی متر می باشد که این رقم در مقایسه با مطالعات صورت گرفته در منطقه طی سالیان گذشته و نیز تحقیقات انجام شده در سایر نقاط دنیا در حد پایین تری قرار دارد (جدول ۱) که می تواند نشان دهنده رشد نامناسب صدف ها باشد. بررسی پراکنش عمقی صدف های مرواریدساز محار در زیستگاه های بررسی شده نشان می دهد که صدف ها عمدتاً در عمق میانی محدوده پراکنش خود دارای بیشترین تراکم می باشند (جدول ۱) و در اعماق بیش از ۱۵ متر هیچ گونه صدف محاری مشاهده نمی گردد. همانگونه که در جدول ۱ نیز مشاهده می شود، متراکم ترین عمق زیستگاه های بررسی شده در تحقیق حاضر (۵ تا ۱۲ متر) عمدتاً با مطالعات گذشته یکسان است.

جدول ۱. مقایسه وضعیت زیستگاه های صدف محار در تحقیق حاضر (شمال خلیج فارس، سال ۱۳۹۱) با برخی از مطالعات صورت گرفته در سالیان گذشته در منطقه خلیج فارس و سایر نقاط دنیا

منبع	مکان تحقیق	مساحت مترمکعب ترین	کل ذخیره	CPUA	میانگین قابل	صید
	(ha)	عمق (m)	(N)	(N/m ²)	DVM(mm)	
لاوان (در دور)	۶۰	۷-۱۲	۳۵۷۰۰۰	۰/۶	۴۰/۲	۱۱٪
لاوان (هدآباد)	۱۵	۵-۱۱	۶۱۵۰۰	۰/۴	۴۱/۳	۱۷٪
لاوان (در دور)	< ۲۰۰	۵-۱۰	۸/۵ × ۱۰ ^۶	۳/۶	۶۱/۸۶	۲۰٪
لاوان (در دور)	۳۰	۵-۱۰	۸ × ۱۰ ^۶	۲۷/۱	۵۰/۱	۵۸/۵٪
مدیرانه	-	-	-	-	۳۹/۵	-
قطر	-	-	-	-	۵۹/۰	-
دریای سرخ	-	۴-۶	۹/۸ × ۱۰ ^۶	-	۳۵/۰	-

به رغم ممنوعیت فعالیت های صیادی در منطقه طی ۷ سال اخیر، نتایج بیان شده نشان می دهد که با توجه به کاهش ذخایر زیستگاه ها، بازسازی ذخایر به کندی صورت گرفته است. صرف نظر از صید غیر مجاز صدف در منطقه که ظاهراً رقم بالایی را

⁵ Patchiness

شامل نمی‌شود، هیچ‌گونه صید مجازی صورت نگرفته است و عدم رشد مطلوب ذخایر می‌تواند صرفاً در اثر شرایط نامطلوب زیستگاه‌ها باشد. عدم مشاهده صدف‌های مرواریدساز در مناطقی که در سالیان اخیر از زیستگاه‌های مهم صدف‌های مرواریدساز محسوب می‌شده است (حسین زاده صحافی، ۱۳۷۲؛ جهانگرد و همکاران، ۱۳۷۶؛ رامشی و همکاران، ۱۳۸۶)، حکایت از دخالت انسان در برهم زدن شرایط طبیعی زیستگاه‌ها و اختلال در احیای صدف‌های مرواریدساز دارد؛ صدف‌های مرواریدساز که بسترهای کم عمق ساحلی را برای نشست^۶ انتخاب می‌کنند، از قربانیان اصلی فعالیت‌های مخاطره‌آمیز انسانی می‌باشند. عدم نشست صدفچه‌های مرواریدساز در زیستگاه‌ها به منزله نابودی کامل یک زیستگاه می‌باشد. صدف‌های مرواریدساز به جهت دارا بودن زندگی ساکن و نداشتن تحرک در اکثر مراحل زندگی و نیز دارا بودن سیستم تغذیه‌ای صافی خواری^۷، بیشتر از سایر آبزبان تحت تأثیر محیط قرار می‌گیرند و ذخایر آنها دستخوش تغییرات بیشتری می‌شود. در چنین شرایطی ممکن است، جمعیت‌های مختلف صدف‌ها از بین رفته یا اینکه رشد آنها به شدت تحت تأثیر قرار گیرد. صدف‌های باقی مانده در یک منطقه می‌توانند به عنوان شاخص زیستی^۸ مطرح شوند و میزان رشد آنها می‌تواند بیانگر شرایط محیطی زیستگاه مربوطه باشد (Al-Madfa et al., 1998).

عوامل مختلف طبیعی و غیرطبیعی می‌تواند ذخایر آبزبان را دستخوش تغییر کند. فعالیت‌های انسانی در منطقه از جمله اسکله سازی غیر اصولی و کارشناسی نشده بدون در نظر گرفتن شرایط زیست محیطی و شیلاتی بستر دریا، می‌تواند حیات مناطق ساحلی را دستخوش تغییرات فراوان نماید. تردد کشتی‌ها در آب‌های بعضاً کم عمق اطراف جزایر، سبب معلق شدن رسوبات کف می‌گردد. شرایط زیست محیطی نامناسب ایجاد شده در خلیج فارس، از جمله گسترش صنایع وابسته به نفت و گاز شامل عملیات اکتشاف و بهره برداری از بستر، خطوط لوله کشی انتقال نفت خام، ترانزیت فرآورده های نفتی، تردد نفتکش‌های غول پیکر در مناطق کم عمق و نیز تخلیه فضولات و آب توازن کشتی‌ها، احتمالاً از عواملی هستند که این منطقه را به یک اکوسیستم حساس و نامتعادل تبدیل کرده اند. Rodgers و همکاران (۲۰۰۰)، محدودیت های زیست محیطی را از عوامل کاهش ذخیره پایای صدف های مرواریدساز لب سیاه در اطراف هاوایی برشمرده اند. Kimani و Mavuti (۲۰۰۲) عنوان نمودند که تراکم بالای موجودات، تغییرات دمایی زیاد و میزان مواد معلق فراوان در محیط، بر روی فراوانی و ساختار جمعیتی صدف های مرواریدساز لب سیاه در سواحل کنیا موثر بوده است.

هر چند در زمینه اثرات آلودگی‌های زیست محیطی و فعالیت‌های انسانی بر ذخایر صدف‌های مرواریدساز در خلیج فارس، مطالعات چندانی صورت نگرفته است، لیکن نمی‌توان عوامل یادشده را در عدم نشست صدفچه‌ها، از بین رفتن زیستگاه‌ها و کاهش شدید ذخایر صدف‌های مرواریدساز بی‌تأثیر دانست. به نظر می‌رسد فعالیت‌های انسانی از جمله اسکله سازی غیراصولی و کارشناسی نشده بدون در نظر گرفتن شرایط زیست محیطی و شیلاتی بستر دریا که در منطقه مورد مطالعه بعضاً مشاهده می‌گردد، و نیز تردد کشتی‌ها در آب‌های بعضاً کم عمق اطراف جزایر، حیات زیستمدان ساحلی از جمله صدف‌های مرواریدساز را دستخوش تغییرات فراوان نموده است.

در جمع بندی نهایی نتایج تحقیق نشان می‌دهد که میزان کل ذخایر موجود در زیستگاه های بررسی شده نسبت به سالیان اخیر به شدت کاهش یافته است و علی‌رغم ممنوعیت صید صدف، بازسازی ذخایر به کندی صورت گرفته است. مساحت زیستگاه های بررسی شده نیز در مقایسه با تحقیقات پیشین کم تر شده و از میزان صدف ها در واحد سطح و نیز درصد صدف‌های قابل صید کاسته شده است.

تشکر و قدردانی

بدینوسیله از زحمات فراوان پرسنل محترم ایستگاه تحقیقاتی نرم‌تنان خلیج فارس بندر لنگه که در گشت‌های دریایی و پشتیبانی مالی و فنی پروژه تلاش نمودند سپاسگزاری می‌گردد.

⁶ Settlement

⁷ Filter feeding

⁸ Bioindicator

منابع

- جهانگرد، ع. ۱۳۷۴. بررسی صید صدف مرواریدساز محار *Pinctada radiata* در صیدگاه‌های بندر مقام و بندر نخیلو (ناحیه غربی استان هرمزگان). موسسه تحقیقات شیلات ایران، ایستگاه تحقیقاتی نرمتنان، بندرلنگه. ۱۶ ص.
- جهانگرد، ع.، اجلالی، ک.، قربانی، ص. ۱۳۷۶. ارزیابی ذخایر صدف های مرواریدساز لنگه ای (*Pinctada radiata*) در زیستگاه های جزیره لاوان و نخیلو. موسسه تحقیقات شیلات ایران. ایستگاه تحقیقاتی نرمتنان، بندرلنگه. ۵۵ ص.
- حسین زاده صحافی، ه. ۱۳۷۲. گزارش بررسی وضعیت صید سنتی صدف. موسسه تحقیقات شیلات ایران. ایستگاه تحقیقاتی نرمتنان خلیج فارس، بندرلنگه. ۷ ص.
- حسین زاده صحافی، ه.، دقوقی، ب.، رامشی، ح. ۱۳۷۹. اطلس نرمتنان خلیج فارس. موسسه تحقیقات شیلات ایران. مرکز تحقیقات شیلاتی دریای عمان. ۲۳۲ ص.
- رامشی، ح. ۱۳۸۰. بررسی وضعیت ذخایر صدف‌های مرواریدساز محار *Pinctada radiata* در زیستگاه‌های لاوان و بندر نخیلو. موسسه تحقیقات شیلات ایران. ایستگاه تحقیقاتی نرمتنان، بندرلنگه. ۹ ص.
- رامشی، ح.، دقوقی، ب.، اجلالی خانقاه، ک.، عبدالعلیان، ع.، خرم، م.، حسین زاده صحافی، ه.، کامرانی، ا. ۱۳۸۶. ارزیابی ذخایر صدف مروارید ساز محار *Pinctada radiata* در غرب استان هرمزگان (لاوان، هندورابی و نخیلو). موسسه تحقیقات شیلات ایران. ایستگاه تحقیقاتی نرمتنان، بندرلنگه. ۳۴ ص.
- فاطمی، م. ر. ۱۳۶۹ (ترجمه). مروارید. وزارت جهاد کشاورزی، معاونت امور شیلات و آبزیان. ۲۷ ص.
- نوربخش، ح. ۱۳۷۰. پژوهشی پیرامون صید، دریا و آبزیان خلیج فارس. انتشارات امیرکبیر، تهران. ۴۴۳ ص.

- Al-Madfa, H., Abdel-Moati, M.A.R., Al-Gimaly, F.H. 1998. *Pinctada radiata* (Pearl Oyster): a bioindicator for metal pollution monitoring in the Qatari waters. *Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology*. 60: 245-251.
- Carter, R. 2005. The history and prehistory of pearling in the Persian Gulf. *Journal of the Economic and Social History of the Orient*. 662: 139-209.
- Gervis, M.H., Sims, N.A. 1992. The biology and culture of pearl oysters (Bivalvia: Pteridae). *ICLARM Studies and Reviews*. 21. 49 p.
- Hill, J., Wilkinson, C. 2004. Methods for ecological monitoring of coral reefs, Version 1. Australian Institute of Marine Science. 122 p.
- Kimani, E.N., Mavuti, K.M. 2002. Abundance and population structure of the blacklip pearl oyster, *Pinctada margaritifera* L. 1758 (Bivalvia: Pteriidae), in coastal Kenya. *Western Indian Ocean Journal of Marine Sciences*. 1(2): 169-179.
- Mohammed, S.Z., Yassien, M.H. 2003. Population Parameters of the Pearl Oyster *Pinctada radiata* (Leach) in Qatari Waters, Arabian Gulf. *Turk Journal of Zoology*. 27: 339-343.
- Rodgers, S.K., Sims, N.A., Sarver, D.J., Cox, E.F. 2000. Distribution, recruitment, and growth of the black-lip pearl oyster, *Pinctada margaritifera* in Kane'ohe Bay, O'ahu, Hawai'i. *Pacific science*. 54(1): 31-38.
- Sims, N.A. 1988. Stock assessment of pearl oyster resources in the Cook Island. *SPC/Inshore Fisheries Research*. BP, 83: 7p.
- Sims, N.A. 1992. Population dynamics and stock management of the black-lip pearl oyster *Pinctada margaritifera* in the Cook Island, south Pacific. *Australian Journal of Marine and Freshwater Research*. 43(6): 1423- 1435.
- Yassien, M.H., Abdel-Razek, F.A., Kilada, R.W. 2000. Growth estimates of the pearl oyster, *Pinctada radiata*, from the Eastern Mediterranean. *Egyptian Journal of Aquatics Biology & Fisheries*. 4: 105-118.
- Yassien, M.H., El-Ganainy, A.A., Hasan, M.H. 2009. Shellfish fishery in the north western part of the Red Sea. *World Journal of Fish and Marine Sciences*. 1(2): 97-104.